

2019秋季学期 微分方程I期末考试

考试时间：2020年1月14日 14:30-16:30

授课教师：张永兵

1

微分方程I(2020年1月14日)

共两页，考试时间两小时。参考公式见第二页。

一、简答题（只需结果，每小题5分，共30分）：

1、设 $\Phi(x) = \Phi(|x|)$ 为 $\mathbb{R}^3 - \{0\}$ 上的调和函数，并且

$$\lim_{r:=|x|\rightarrow\infty} \Phi(x) = 0, \quad \int_{\partial B_R(0)} \frac{\partial \Phi}{\partial r} dS = -1.$$

(1) 给出 $\Phi(x), x \in \mathbb{R}^3 - \{0\}$ 具体表达式。

(2) 设 $f \in C_0^\infty(\mathbb{R}^3)$ ，给出 $\Delta u = f$ 的一个有界解 $u(x)$ 。

2、设 $x = (x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}_+^3, \tilde{x} = (x_1, x_2, -x_3), g \in C_0^\infty(\partial\mathbb{R}_+^3)$ 。

(1) 给出 \mathbb{R}_+^3 上拉普拉斯算子的Green函数 $G(x, y)$ 以及 $\frac{\partial G}{\partial y_3}$ 的表达式。

(2) 给出 $\begin{cases} \Delta u = 0, & \text{in } \mathbb{R}_+^3 \\ u = g, & \text{on } \partial\mathbb{R}_+^3 \end{cases}$ 的一个解 $u(x)$ 。

3、定义 $\Phi(x, t) = \frac{1}{(4\pi t)^{\frac{n}{2}}} e^{-\frac{|x|^2}{4t}}, x \in \mathbb{R}^n, t > 0$ 。

(1) 分别计算 $\frac{\partial \Phi}{\partial t}$ 与 $\Delta_x \Phi$ 。

(2) 给出初值问题 $\begin{cases} u_t - \Delta_x u = 0, & \text{in } \mathbb{R}^n \times (0, \infty) \\ u = g, & \text{on } \mathbb{R}^n \times \{t = 0\} \end{cases}$ 的一个解 $u(x, t)$ 。

二 (15 + 10分)、设 a, b, h, l 为正常数，并且 $b < l$ 。

1、求如下初边值问题的解 $u(t, x)$

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2 u_{xx}, & t > 0, 0 < x < l, \\ u(t, 0) = u(t, l) = 0, \\ u_t(0, x) = 0, \\ u(0, x) = \begin{cases} \frac{h}{b}x, & 0 \leq x \leq b; \\ \frac{h}{l-b}(l-x), & b \leq x \leq l. \end{cases} \end{cases}$$

2、利用能量方法证明如上初边值问题的解唯一。

三 (10分)、设 $u \in C^2(U) \cap C(\bar{U})$ 。建立固有值问题，并利用固有值问题的解求解

$$\begin{cases} \Delta_3 u = 0, & \text{in } U := \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 | x^2 + y^2 + z^2 < 1\}, \\ u = (1+z)^2, & \text{on } \partial U. \end{cases}$$

四 (15分)、设 $U = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 | x^2 + y^2 < 1, y > 0\}$, $u \in C^2(U) \cap C(\bar{U})$.

(1) 求 $\begin{cases} \Delta_2 u = u_{xx} + u_{yy} = 0, & \text{in } U \\ u = 0, & \text{on } \partial U \cap \{y = 0\} \end{cases}$ 的通解。

(2) 求解 $\begin{cases} \Delta_2 u = u_{xx} + u_{yy} = 0, & \text{in } U \\ u = y(10 - 12y^2), & \text{on } \partial U. \end{cases}$

五 (20分):

1、设 $U \subset \mathbb{R}^n$ 为有界开集, $u \in C^\infty(\bar{U})$.

(1) 设 $\Delta u = 0$, 证明

$$\max_{\partial U} |Du|^2 = \max_{\bar{U}} |Du|^2.$$

(2) 设 $\begin{cases} \Delta u = f, & \text{in } U \\ u = g, & \text{on } \partial U. \end{cases}$ 证明存在常数 $C(U, n) > 0$ 使得

$$\max_{\bar{U}} |u| \leq C(U, n) (\max_{\bar{U}} |f| + \max_{\partial U} |g|).$$

2、设 $u: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 为调和函数。记 ω_n 为单位球体积。

(1) 利用调和函数平均值公式证明

$$\frac{\partial u}{\partial x_i}(x_0) = \frac{1}{\omega_n R^n} \int_{B_R(x_0)} \frac{\partial u}{\partial x_i}(y) dy.$$

(2) 设 $u \geq 0$. 证明 u 为常值函数。

参考公式:

极坐标 (r, θ) 下, $\Delta_2 u = u_{rr} + \frac{1}{r} u_r + \frac{1}{r^2} u_{\theta\theta}$

球坐标 (r, θ, φ) 下 (其中 $(x, y, z) = (r \sin \theta \cos \varphi, r \sin \theta \sin \varphi, r \cos \theta)$),

$$\Delta_3 u = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} (r^2 \frac{\partial u}{\partial r}) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} (\sin \theta \frac{\partial u}{\partial \theta}) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 u}{\partial \varphi^2}.$$

Legendre 多项式的 Rodrigues 公式:

$$P_n(x) = \frac{1}{2^n n!} \frac{d^n}{dx^n} (x^2 - 1)^n, \quad n \geq 0.$$

最大值原理: 设 $U \subset \mathbb{R}^n$ 为有界开集, $u \in C^2(\bar{U})$, $\Delta u \geq 0$ in U , 则

$$\max_{\bar{U}} u = \max_{\partial U} u.$$