

1. 计算

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left( (1+x^2) \sin \frac{1}{x} \right)$$

2. 假设

$$f(x) = \begin{cases} x^2, & \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}; \\ 0, & \mathbb{Q} \end{cases}$$

问  $f$  在哪些点可导? (说明理由)

3. 假设

$$a_n = |b_1 - b_2| + |b_2 - b_3| + \cdots + |b_{n-1} - b_n|, \forall n \in \mathbb{N}$$

如果数列  $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$  有界, 证明: 数列  $\{b_n\}_{n=1}^{\infty}$  收敛。

4. 设函数  $f$  在  $[a, b]$  上单调递增, 而且

$$a < f(a) < f(b) < b$$

证明: 存在  $\xi \in (a, b)$ , 使得  $f(\xi) = \xi$ 。

5. 证明函数  $\cos \sqrt{x}$  在  $[0, +\infty)$  一致连续。

6. 假设

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{x^2 e^{n(x-1)} + ax + b}{e^{n(x-1)} + 1}$$

如果  $f(x)$  在  $x = 1$  可导, 求  $a, b$  的值。

7. 假设函数  $f: \mathbb{R} \rightarrow (0, +\infty)$  满足

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left( f(x) + \frac{1}{f(x)} \right) = 2$$

证明:  $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$  存在。

8. 假设函数  $f$  在  $[a, b]$  上连续, 在  $(a, b)$  二阶可导, 且  $f(a) = f(b) = 0, f\left(\frac{a+b}{2}\right) > 0$ , 证明: 存在  $\xi \in (a, b)$  使得  $f''(\xi) < 0$ 。

9. 设  $f(x)$  在  $[0, +\infty)$  上二阶可导,  $f(0) = 1, f'(0) \leq 1, f''(x) < f(x)$ 。证明: 当  $x > 0$  时,  $f(x) < e^x$

10. 假设  $f(x)$  是  $\mathbb{R}$  上的严格凸的二阶可导函数, 证明:  $\forall \xi \in \mathbb{R}, \exists x_1, x_2 \in \mathbb{R}$  使得

$$f'(\xi) = \frac{f(x_1) - f(x_2)}{x_1 - x_2}$$